

# ថ្នាំបង្ការរោគ គ្រុនផ្តាសាយធំ 2009 H1N1

**ថ្នាំរស់ ដែលខ្សោយ**  
(ថ្នាំបង្ការរោគបាញ់តាមច្រមុះ)

**អ្វីដែលលោកអ្នកត្រូវដឹង**

មានសេចក្តីថ្លែងព័ត៌មានថ្នាំបង្ការរោគ ជាច្រើន ជាភាសាអង់គ្លេស និងជាភាសាផ្សេងៗទៀត ។ សូមមើលទៅ [www.immunize.org/vis](http://www.immunize.org/vis) ។

## 1 តើគ្រុនផ្តាសាយធំ 2009 H1N1 ជាអ្វី?

គ្រុនផ្តាសាយធំ 2009 H1N1 (ជួនកាលគេហៅថា Swine Flu) ជាភាសាខ្មែរហៅថា ស្កររោគគ្រុនផ្តាសាយ ឬគ្រុនផ្តាសាយជ្រូក បានបណ្តាលដោយសារពូជមេរោគវិរុស ថ្មីនៃគ្រុនផ្តាសាយធំ ។ វាបានឆ្លងរាលដាលទៅប្រទេសជាច្រើន ។

ដូចគ្នានឹងមេរោគគ្រុនផ្តាសាយធំផ្សេងៗទៀតដែរ រោគ 2009 H1N1 ឆ្លងរាលដាលពី មនុស្សម្នាក់ ទៅមនុស្សម្នាក់ទៀត តាមរយៈការក្អក ការកណ្តាល ហើយជួនកាលតាម រយៈការប៉ះនឹងវត្ថុអ្វីដែលមានប្រឡាក់មេរោគវិរុស ។

សញ្ញានៃរោគ 2009 H1N1 អាចរួមមាន :

- ហត់រហែ
- គ្រុនក្តៅ
- ឈឺបំពង់ក
- ឈឺសាច់ដុំ
- ស្រៀវស្រាញ
- ក្អក
- កណ្តាល

មនុស្សខ្លះទៀតក៏អាចមានការរាករាស និងក្អកចង្កោរផងដែរ ។

មនុស្សភាគច្រើនបានស្រួលខ្លួនឡើងវិញ ក្នុងពេលមួយអាទិត្យ ។ ប៉ុន្តែមនុស្សមួយ ចំនួន អាចមានរោគហើមសួត ឬមានជំងឺធ្ងន់ធ្ងរផ្សេងទៀត ។ រីឯមនុស្សខ្លះទៀត នឹង ត្រូវចូលសំរាកនៅមន្ទីរពេទ្យ ហើយខ្លះទៀតអាចនឹងស្លាប់ ។

## 2 តើរោគ 2009 H1N1 ខុសគ្នាពីគ្រុនផ្តាសាយធំ (តាមរដូវ) ធម្មតា ដោយរបៀបណា?

មេរោគវិរុសគ្រុនផ្តាសាយធំតាមរដូវ គ្លាស់ប្តូរពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំ ប៉ុន្តែវាមានភាព ស្រដៀងនឹងគ្នាណាស់ ។

មនុស្សដែលធ្លាប់កើតមានគ្រុនផ្តាសាយធំ នៅពេលកន្លងទៅ តាមធម្មតាមានភាពស្ថា រោគខ្លះ ចំពោះនឹងមេរោគវិរុសគ្រុនផ្តាសាយធំតាមរដូវ (ខ្លួនប្រាណរបស់គេបានកើន សមត្ថភាពខ្លះ ដើម្បីតាំងនឹងមេរោគវិរុស) ។

មេរោគវិរុសគ្រុនផ្តាសាយធំ 2009 H1N1 គឺជាពូជមេរោគវិរុសគ្រុនផ្តាសាយថ្មីមួយ ។ វាមានភាពខុសគ្នាយ៉ាងខ្លាំង អំពីមេរោគវិរុសគ្រុនផ្តាសាយធំតាមរដូវ ។

មនុស្សភាគច្រើនមានភាពស្ថាម្រិតបន្តិច ឬគ្មានភាពស្ថាម្រិតសោះ ចំពោះគ្រុន ផ្តាសាយធំ 2009 H1N1 (ខ្លួនប្រាណរបស់គេមិនបានប្រុងប្រយ័ត្នដើម្បីតាំងនឹង មេរោគវិរុសឡើយ) ។

## 3 ថ្នាំបង្ការរោគគ្រុនផ្តាសាយធំ 2009 H1N1

សព្វថ្ងៃនេះមានថ្នាំបង្ការរោគ ដើម្បីការពារប្រឆាំងនឹងគ្រុនផ្តាសាយធំ 2009 H1N1 ។

- ថ្នាំបង្ការរោគទាំងនេះ គឺបានផលិតឡើងដូចគ្នានឹងថ្នាំបង្ការរោគគ្រុនផ្តាសាយធំ តាមរដូវដែរ ។
- ថ្នាំទាំងនេះត្រូវបានរំពឹងថាមានសុវត្ថិភាព និងមានប្រសិទ្ធភាពដូចគ្នានឹងថ្នាំបង្ការ រោគគ្រុនផ្តាសាយធំតាមរដូវដែរ ។
- ថ្នាំទាំងនេះនឹងមិនការពារជំងឺ “ដូចគ្រុនផ្តាសាយធំ” ដែលបានបណ្តាលមកពី មេរោគវិរុសផ្សេងៗទៀតឡើយ ។
- ថ្នាំទាំងនេះនឹងមិនការពារគ្រុនផ្តាសាយធំតាមរដូវទេ ។ **ដើម្បីការពារការព្យាបាល គ្រុនផ្តាសាយធំតាមរដូវ អ្នកគួរតែចាក់ថ្នាំបង្ការរោគគ្រុនផ្តាសាយធំតាមរដូវផងដែរ ។**

ថ្នាំបង្ការរោគរស់ ដែលខ្សោយបាញ់តាមច្រមុះ (Live, attenuated intranasal) ឬហៅកាត់ថា LAIV ត្រូវបានបាញ់ចូលទៅច្រមុះ ។ សន្លឹកនេះរៀបរាប់អំពីថ្នាំបង្ការ រោគរស់ ដែលខ្សោយបាញ់តាមច្រមុះ ។

សព្វថ្ងៃនេះក៏មានថ្នាំបង្ការរោគអសកម្មដែរ ដែលត្រូវបានផ្តល់ឲ្យជាថ្នាំចាក់ ។ ព័ត៌មាន អំពីថ្នាំនេះ មានរៀបរាប់នៅសន្លឹកមួយដោយឡែកទៀត ។

ថ្នាំ 2009 H1N1 LAIV ពុំមានសារធាតុធ្វើអ៊ីរ៉ូសាលី (thimerosal) ឬសារធាតុរក្សាទុក ផ្សេងទៀតទេ ។ ថ្នាំនេះបានអនុញ្ញាតសំរាប់មនុស្សអាយុពី 2 ឆ្នាំ រហូត ដល់ 49 ឆ្នាំ ។

ថ្នាំបង្ការមេរោគវិរុស គឺបានខ្សោយ (អន់ខ្សោយ) ដូច្នេះហើយវានឹងមិនបណ្តាល ឲ្យមានជំងឺទេ ។

## 4 តើអ្នកណាខ្លះ គួរតែទទួលថ្នាំបង្ការរោគគ្រុន ផ្តាសាយធំ 2009 H1N1 និងនៅពេលណា?

**អ្នកណាខ្លះ**

ថ្នាំ LAIV បានយល់ព្រមឲ្យប្រើ សំរាប់មនុស្សតាំងពីអាយុ 2 ឆ្នាំ រហូតដល់ 49 ឆ្នាំ ដែលគ្មានផ្ទៃពោះ និងដែលពុំមានលក្ខណៈសុខភាពខ្លះ (មើលលេខ 5 ខាងក្រោម) ។ ក្រុមមនុស្សដែលបានឲ្យយោបល់ដើម្បីទទួលថ្នាំ 2009 H1N1 LAIV ជាដំបូងគេ គឺមនុស្សមានសុខភាពល្អ ដែល :

- មានអាយុតាំងពី 2 ឆ្នាំ រហូតដល់ 24 ឆ្នាំ
- មានអាយុតាំងពី 25 ឆ្នាំ រហូតដល់ 49 ឆ្នាំ និង
  - រស់នៅជាមួយ ឬមើលថែទាំទារក អាយុក្មេងជាង 6 ខែ ឬ
  - អ្នកថែរក្សាសុខភាព ឬបុគ្គលិកពេទ្យផ្នែកសង្រ្គោះភាពអាសន្ន ។

នៅពេលណាមានថ្នាំបង្ការរោគថែមទៀត មនុស្សផ្សេងទៀតដែលមានសុខភាពល្អ ចាប់តាំងពីអាយុ 25 ឆ្នាំ រហូតដល់ 49 ឆ្នាំ ក៏គួរតែបានចាក់ថ្នាំបង្ការរោគដែរ ។

កំណត់ : ទន្ទឹមនឹងក្រុមមនុស្សខ្លះមិនគួរទទួលថ្នាំ LAIV បានទេ - ឧទាហរណ៍ដូចជា ស្ត្រីមានផ្ទៃពោះ មនុស្សដែលមានបញ្ហាសុខភាពត្រាំត្រង និងក្មេងៗ ចាប់ តាំងពីអាយុ 6 ខែ ទៅដល់ 2 ឆ្នាំ - ភិក្ខុជាសាសនាសំខាន់ ចាំគេ ត្រូវបានចាក់ថ្នាំបង្ការរោគ ។ គេគួរតែបានចាក់ថ្នាំការពារគ្រុនផ្តាសាយធំ ។

រដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធកំពុងតែផ្តល់ថ្នាំបង្ការរោគនេះ សំរាប់មនុស្សព្រមទទួលដោយ ស្ម័គ្រចិត្ត ។ តែជាយ៉ាងណាមិញ ច្បាប់រដ្ឋ ឬក្រុមហ៊ុនការងារ អាចនឹងជំរុញឲ្យមាន ការចាក់ថ្នាំបង្ការរោគ សំរាប់មនុស្សមួយចំនួន ។

**ពេលវេលា**

ត្រូវចាក់ថ្នាំបង្ការរោគ យ៉ាងតិចប្រាំមួយខែនៅពេលមានថ្នាំបង្ការរោគ ។

ក្មេងៗមានអាយុរហូតដល់ទៅ 9 ឆ្នាំ គួរតែទទួលថ្នាំបង្ការរោគពីរដូវស្ប គឺពីរកើតចន្លោះ គ្នាប្រហែលជាពីរខែ ។ ក្មេងៗដែលចាស់ជាង និងមនុស្សចាស់ ត្រូវការតែមួយដូវស្ប ប៉ុណ្ណោះ ។

**5 មនុស្សខ្លះមិនគួរគប្បីទទួលថ្នាំបង្ការរោគទេ ឬគួរតែរង់ចាំ**

បើអ្នកមានប្រតិកម្មធ្ងន់ធ្ងរ (ការរំលោភបំពាន) ដោយមានប្រតិកម្មនឹងពងសត្វ ឬសារ ពាតុអ៊ីផ្សេងទៀតនៅក្នុងថ្នាំបង្ការរោគ អ្នកមិនត្រូវទទួលថ្នាំ 2009 H1N1 LAIV ទេ ។ បើអ្នកមានប្រតិកម្មធ្ងន់ធ្ងរអ្វីមួយ ត្រូវប្រាប់មនុស្សដែលផ្តល់ថ្នាំបង្ការរោគអ្នក ។

- ថ្នាំ 2009 H1N1 LAIV មិនត្រូវបានច្រើនទៅក្រុមមនុស្សនៅខាងក្រោមឡើយ ។
- ក្មេងៗអាយុតិចជាង 2 ឆ្នាំ និងមនុស្សចាស់អាយុ 50 ឆ្នាំ និងចាស់ជាង
- ស្ត្រីមានផ្ទៃពោះ
- មនុស្សណាម្នាក់ ដែលខ្សោយខាងប្រព័ន្ធសារមាត់
- មនុស្សណាម្នាក់ ដែលមានបញ្ហាសុខភាពត្រាំត្រង ដូចជា
  - រោគបេះដូង
  - រោគដំរងនោម ឬរោគថ្លើម
  - រោគសួត
  - រោគដំណើររបំបែកអាហារ ដូចជារោគទឹកនោមផ្អែម
  - រោគហឺត
  - រោគខ្វះឈាមក្រហម និងបញ្ហាពេលវេលាផ្សេងៗទៀត
- ក្មេងៗអាយុតិចជាង 5 ឆ្នាំ ដែលមានរោគហឺត ឬមានលក្ខណៈមួយ ឬច្រើនជាង នៃការឆ្លងផ្លូវចិត្ត នៅក្នុងកុមារភ្នាក់ងារទៅ
- មនុស្សណាម្នាក់ ដែលមានបញ្ហាខាងសាច់ដុំ ឬរលាស់ប្រសាទអ្វីមួយ (ដូចជា រោគវិកលខួរក្បាល) ដែលអាចបញ្ហាឲ្យមានបញ្ហាខាងការដកដង្ហើម ឬការលេប
- មនុស្សណាម្នាក់ ដែលនៅជិតស្និទ្ធនឹងជនណាម្នាក់ដែលមានប្រព័ន្ធសារមាត់ អន់ខ្សោយជាអនេក (ដែលត្រូវការថែទាំក្នុងបរិស្ថានដែលការពារ ដូចជាផ្នែកផ្សា ខ្លាញ់)
- ក្មេងៗ ឬក្មេងៗដទៃទៀត ដែលទទួលបានការព្យាបាលដោយប្រើថ្នាំអាស៊ីតិកយូលដង ។

បើអ្នកមានជំងឺគុនស្រាល ឬធ្ងន់ធ្ងរ អ្នកអាចទទួលបានថ្នាំបង្ការរោគបានស្មើគ្នា ។ មិនមែនទទួលបានថ្នាំបង្ការរោគ ។ បើអ្នកមានគុនស្រាលគុនស្រាល ឬមានជំងឺ ផ្សេងៗទៀត តាមធម្មតាមិនបាច់រង់ចាំទេ ។

- ត្រូវប្រាប់គ្រូពេទ្យរបស់អ្នក បើអ្នកធ្លាប់មាន :
- ប្រតិកម្មដែលគំរាមកំហែងជីវិត បន្ទាប់ពីទទួលបានថ្នាំបង្ការរោគគុនស្រាលគុនស្រាល
  - រោគ Guillain-Barré Syndrome (ជារោគកំរើកប្លែងធ្ងន់ធ្ងរ ដែលកំហែកាត់ថា GBS ដែរ) ។

ថ្នាំទាំងនេះអាចនឹងមិនមែនជាមូលហេតុ ដើម្បីជៀសវាងថ្នាំបង្ការរោគទេ ប៉ុន្តែបុគ្គលិក ពេទ្យអាចជួយអ្នកសំរេចបាន ។

ថ្នាំ 2009 H1N1 LAIV អាចនឹងឲ្យនៅពេលដូចគ្នា ដូចថ្នាំបង្ការរោគភាគច្រើន ផ្សេងៗទៀតដែរ ។ ត្រូវប្រាប់គ្រូពេទ្យរបស់អ្នក បើអ្នកបានទទួលថ្នាំបង្ការរោគអ្វីមួយ ផ្សេងទៀត ក្នុងខែកន្លងមក ឬប្រហែលនឹងទទួលបានថ្នាំបង្ការរោគអ្វីមួយ ក្នុងខែបន្ទាប់ទៀត ។ ថ្នាំ H1N1 LAIV និងថ្នាំ LAIV តាមរដូវ មិនគួរឲ្យនៅពេលស្របគ្នាឡើយ ។

**6 តើមានគ្រោះថ្នាក់អ្វីខ្លះ បណ្តាលមកពីថ្នាំ 2009 H1N1 LAIV?**

ថ្នាំបង្ការរោគ ក៏ដូចនឹងថ្នាំផ្សេងៗទៀតដែរ ដែលអាចបណ្តាលឲ្យមានបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរ ដូចជា មានប្រតិកម្មខ្លាំង ជាដើម ។ ប៉ុន្តែការគ្រោះថ្នាក់នៃថ្នាំបង្ការរោគណាមួយ ដែលបណ្តាល ឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ធ្ងន់ធ្ងរ ឬស្លាប់ គឺមានតិចតួចណាស់ ។

ភាពគ្រោះថ្នាក់កើតចេញពីថ្នាំ 2009 H1N1 LAIV ត្រូវបានរំពឹងថាមានភាពស្រដៀង គ្នានឹងថ្នាំ LAIV តាមរដូវដែរ :

- បញ្ហាស្រាលៗ :
- គេបានរាយការណ៍ថា កូនក្មេង និងក្មេងៗដទៃទៀតមួយចំនួន ពីអាយុ 2-17 ឆ្នាំ មានប្រតិកម្មគុនស្រាល រួមមាននូវ :
- ការហៀរសំបោរ ការឆ្អឹងច្រមុះ ឬក្អក
  - ឈឺក្បាល និងឈឺសាច់ដុំ
  - ឈឺដំបូរពោះ ឬការក្អកចង្កោរ ឬចុះរាក ម្តងម្កាត់
  - គ្រុនក្តៅ
  - ការឆ្អឹងដង្ហើម

DCH-1470CA  
AUTH: P.H.S., Act 42, Sect. 2126.

- គេបានរាយការណ៍ថា មនុស្សចាស់មួយចំនួន ពីអាយុ 18-49 ឆ្នាំ មាន :
- ការហៀរសំបោរ ឬការឆ្អឹងច្រមុះ
  - ឈឺបំបែង
  - ក្អក ស្រៀវស្រាញ អស់កម្លាំង/ខ្សោយកម្លាំង
  - ឈឺក្បាល

- បញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរ :
- ប្រតិកម្មដែលគំរាមកំហែងជីវិត នៅនឹងថ្នាំបង្ការរោគ គឺកម្រមានណាស់ ។ បើ សិនជាវាកើតឡើង តាមធម្មតាវាមានក្នុងពេលពីរបីនាទី ទៅពីរបីម៉ោង បន្ទាប់ពី បានទទួលថ្នាំបង្ការរោគ ។
  - នៅក្នុងឆ្នាំ 1976 ប្រភេទដំបូងនៃថ្នាំបង្ការរោគផ្តាសាយ (swine flu ឬគ្រុន ផ្តាសាយជ្រូក) បានជាប់ទាក់ទងជាមួយនឹងករណីនៃរោគ Guillain-Barré Syndrome (GBS) ។ ថ្នាំ LAIV មិនជាប់ទាក់ទងទៅនឹងរោគ GBS ទេ ។

**7 ចុះបើសិនជាមានប្រតិកម្មធ្ងន់ធ្ងរវិញនោះ?**

**តើខ្ញុំគួរតែឃ្នាំរកមើលអ្វី?**  
លក្ខណៈចម្លែកអ្វីមួយខុសពីធម្មតា ដូចជាគ្រុនក្តៅខ្លាំង ឬអាកប្បកិរិយាប្លែកប្លែក ។ សញ្ញានៃប្រតិកម្មធ្ងន់ធ្ងរ អាចរួមមាន ការពិបាកដកដង្ហើម ស្លាកសំបោរ ឬការឆ្អឹងដង្ហើម មានកន្ទួលលើស្បែក ស្លេកស្លាំង ខ្សោយកម្លាំង ចង្កាក់ដុះបង្កើនដើរហៀរ ឬវិលមុខ ។

- តើខ្ញុំត្រូវធ្វើយ៉ាងណា?**
- ទូរសព្ទទៅគ្រូពេទ្យ ឬយកមនុស្សនោះទៅជួបគ្រូពេទ្យជាបន្ទាន់ ។
  - ប្រាប់គ្រូពេទ្យ អំពីអ្វីដែលបានកើតឡើង បានកើតឡើងនៅថ្ងៃខែឆ្នាំណា និងពេល ម៉ោងប៉ុន្មាន ហើយបានទទួលថ្នាំបង្ការរោគពីពេលណា ។
  - ស្នើគ្រូពេទ្យរបស់អ្នក ឲ្យរាយការណ៍អំពីប្រតិកម្ម ដោយបំពេញក្រដាសប្រព័ន្ធរាយ ការណ៍ព្រឹត្តិការណ៍ប្រតិកម្មថ្នាំបង្ការរោគ (Vaccine Adverse Event Reporting System - VAERS) ។ ឬអ្នកអាចបំពេញសេចក្តីរាយការណ៍នេះ តាមរូបសេរីរបស់ VAERS នៅ [www.vaers.hhs.gov](http://www.vaers.hhs.gov) ឬដោយទូរសព្ទទៅលេខ 1-800-822-7967 ។

VAERS មិនផ្តល់វិទ្យាទិន្នន័យសុខភាពឡើយ ។

**8 ការធានារ៉ាប់រងគ្រោះថ្នាក់ បណ្តាលមកពី ថ្នាំបង្ការរោគ**

បើប្រសិនបើអ្នក ឬកូនរបស់អ្នក មានប្រតិកម្មទៅនឹងថ្នាំបង្ការរោគ សមត្ថភាពរបស់អ្នក ដើម្បីប្តឹងផ្តល់ គឺបានកំរិតដោយច្បាប់ ។

តែជាយ៉ាងណាមិញ កម្មវិធីនៃអនុប្រតិបត្តិការ បានបង្កើតឡើងដើម្បីជួយបង់ថ្លៃ ការថែទាំពេទ្យ និងការចំណាយផ្សេងៗទៀត សំរាប់មនុស្សមួយចំនួន ដែលមាន ប្រតិកម្មធ្ងន់ធ្ងរ ទៅនឹងថ្នាំបង្ការរោគនេះ ។ សំរាប់ព័ត៌មានបន្ថែមអំពីកម្មវិធីនេះ សូមទូរសព្ទលេខ 1-888-275-4772 ឬមើលរូបសេរីរបស់កម្មវិធី នៅ : [www.hrsa.gov/countermeasurescomp/default.htm](http://www.hrsa.gov/countermeasurescomp/default.htm) ។

**9 តើខ្ញុំធ្វើយ៉ាងណា ឲ្យបានយល់ដឹងបន្ថែមទៀត?**

- សាកសួរគ្រូពេទ្យរបស់អ្នក ។ គេអាចផ្តល់ព័ត៌មានដែលមានភ្ជាប់ជាមួយប្រអប់ថ្នាំ ឬផ្តល់យោបល់អំពីប្រភពព័ត៌មានផ្សេងៗទៀត ។ 1-888-767-4687
- សូមទូរសព្ទទៅក្រសួងសុខាភិបាលប្រចាំតំបន់ ឬក្រសួងសុខាភិបាលរដ្ឋ ។
- សូមទាក់ទងទៅមណ្ឌលសំរាប់បណ្តុះបណ្តាល និងបង្ការជំងឺ (Centers for Disease Control and Prevention - CDC) :
  - សូមទូរសព្ទទៅលេខ 1-800-232-4636 (1-800-CDC-INFO) ឬ
  - សូមមើលរូបសេរីរបស់ CDC នៅ [www.cdc.gov/h1n1flu](http://www.cdc.gov/h1n1flu) ឬ [www.cdc.gov/flu](http://www.cdc.gov/flu)
  - សូមមើលរូបសេរីនៅ [www.flu.gov](http://www.flu.gov)

DEPARTMENT OF HEALTH AND HUMAN SERVICES  
CENTERS FOR DISEASE CONTROL AND PREVENTION

Vaccine Information Statement  
2009 H1N1 LAIV IMM-979CA - Cambodian 10/2/09  
Translated by Transcend Translations, Davis, CA

42 U.S.C. §300aa-26  
[www.transcend.net](http://www.transcend.net)

ដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកផ្តល់ការព្យាបាលសុខភាពស្នើសុំនូវព័ត៌មានអំពីការចាក់ថ្នាំបង្ការរោគពេញលក្ខណ៍ត្រឹមត្រូវ. ការពិនិត្យមើលនៃការចាក់ថ្នាំបង្ការរោគ ហើយនិងការតម្រូវដាក់ពេលវេលា សំរាប់ចាក់ថ្នាំបង្ការរោគនៅអនាគត, ព័ត៌មានអំពីការចាក់ថ្នាំបង្ការរោគនឹងធ្វើទៅមន្ទីរ Michigan Care Improvement Registry ។ បុគ្គលទាំងឡាយមានសិទ្ធិស្នើសុំអោយអ្នកផ្តល់ការព្យាបាលសុខ ភាពមិនអោយបញ្ជូនព័ត៌មានអំពីការចាក់ថ្នាំ បង្ការរោគនេះទៅឲ្យកន្លែងទុកសំណុំរឿងបាន។